

耕 種 的 防 除 法

微生物利用土壌改良材

VSTリコ

(ト リ コ デ ル マ 菌)



トリコデルマ菌は悪玉菌から作物を守ります。

土壌微生物相の改善や、土壌消毒後の静菌作用向上に
有効な微生物利用土壌改良材です。

ブイエス科工株式会社

<http://www.vs-kakou.co.jp>

〒105-0004

東京都港区新橋 5-7-5 富士屋ビル 3F

Since 1961

VSトリコは、国産バーミキュライトにトリコデルマ菌を


培養吸着した微生物利用の土壌改良材です。

*バーミキュライトは粘土鉱物。透水性・保水性・保肥力を改善する政令指定の土壌改良材です。土壌に使用したものは半永久的にその機能を持ち続けます。
特に国産バーミキュライトは高品質で安全性に優れています。

VSトリコ 1g中に含まれる主な分離菌と生菌数

糸状菌	トリコデルマ属	$10^8 / g$
-----	---------	------------

(社)日本食品分析センター 分析結果



国産バーミキュライトの拡大写真

使用方法 (以下のいずれかの場合にお使い下さい)

苗床	$3.3m^2 \times 1m$	VSトリコ…1袋 VS34+VSあかきん
----	--------------------	-------------------------

10a当り	①表面(部分)処理	②全面処理
果菜類・葉菜類 根菜類・花卉類	VSトリコ…5袋 米ヌカ又はカニガラ50kg 定植後、活着してから地表面に散布	VSトリコ…5～10袋 米ヌカ又はカニガラ50～100kg 上記を全面に散布して二回ほどすき 起こし15日後に定植
果樹	成木1本当り VSトリコ 1袋 表層5～10センチに散布	VSトリコ…5～10袋 ①表層施用後、土壌混和 ②タコツボ施用
茶樹	病害発生部 $3.3m^2$ 当り VSトリコ 1kg	VSトリコ…5袋 樹上や畝間に散布

※ネギやサトイモなどは土寄せ時に散布してください。

注意事項

1. 植ミソや植穴への施用が効果的です。(その際は十分な水分を与えてください)
2. VS34・VSあかきんとの併用は一層効果を発揮します。
3. トリコデルマ菌は酸性環境下で生育が旺盛になります。
4. 土壌消毒を行う場合はガス抜き後に施用してください。
5. 未分解有機物との併用の時は二週間以上おいてください。
6. 冷暗所にて保管してください。製品の有効期間は一年間です。