

抵抗性害虫や 幅広い害虫に。 いもち病や 紋枯病にも。 新時代の 農薬、登場!

多様な害虫に効果を示す新しい殺虫剤「アレス」、
いもち病防除に長年の実績がある殺菌剤「スタウト」、
紋枯病に優れた効果を示す殺菌剤「モンガレス」を含有。
育苗箱処理で水稻の各種病害虫を防除できます。

有効成分が
幅広い害虫に
Oxazosulfyl
オキサソスルフィル

紋枯病に!
Inpyrfluxam
インピルフルキサム

- 主要害虫防除も、いもち病・紋枯病防除も、これ一つでOK
- 既存の殺虫剤に抵抗性を持った害虫にも効く
- 幅広い害虫に高い効果を発揮
- 育苗時の使用で効き目長持ち



さまざまな病害虫に効く



トビイロウンカ セジロウンカ ヒメトビウンカ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ コブノメイガ コバネイナゴ いもち病 紋枯病

水稻育苗箱用殺虫殺菌剤

スタウト® アレス® モンガレス® 箱粒剤

スタウト、アレス及びモンガレスは住友化学(株)の登録商標

スタウト アレス モンガレス[®] 箱粒剤

有効成分: オキサズルフィル…2.0%、インチアニル…2.0%、インビルフルキサム…2.0%

殺虫剤分類 UN
殺菌剤分類 P3,7

特長

- 1つの殺虫成分で幅広い害虫に高い効果
- 既存の殺虫剤に抵抗性を持つ害虫にも優れた効果
- いもち病や紋枯病にも高い効果

有効成分が
幅広い害虫に
Oxazosulfyl
オキサズルフィル

紋枯病に!
Inpyrfluxam
インビルフルキサム

2022年2月現在の登録内容

適用病害虫および使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサズルフィルを含む農業の総使用回数	インチアニルを含む農業の総使用回数	インビルフルキサムを含む農業の総使用回数
稲(育苗箱)	苗立枯菌病 苗腐敗症(もみ枯菌病)	育苗箱(※)1箱当り50g 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(※) 1箱当り50~100g)	は種時 (覆土前)	1回	育苗箱の 上から 均一に 散布する	1回	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、本田では2回以内)	1回
	イネミズソウムシ、イネドロオウムシ ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ フタオビコヤガ、イネツトムシ、コブノメイガ イナゴ類、いもち病、白葉枯病、もみ枯菌病 穂枯れ(ごま葉枯病)、内穎褐変病、紋枯病	育苗箱(※)1箱当り50g 高密度には種する場合は 1kg/10a(育苗箱(※) 1箱当り50~100g)	は種時 (覆土前) ~移植当日					
稲	いもち病 紋枯病	1kg/10a	移植時		側条施用		3回以内 (直播では種時 又は移植時までの処理は 1回以内、本田では2回以内)	

※: 30×60×3cm、使用土壌約5L

試験成績

■トビイロウンカ

試験場所: 山口県農林総合技術センター
(2020年)
品 種: ヒノヒカリ
播 種 日: 5月27日
移 植 日: 6月19日
処理時期: 移植3日前(対照剤は移植当日)
発生状況: 甚発生
調 査 日: 8月19日(移植61日後)、
9月1日(移植74日後)
調査方法: 計48株について成虫数および
幼虫数を見取り調査。




■コブノメイガ

試験場所: 一般社団法人 日本植物防疫
協会岡山試験地(2020年)
品 種: にこまる
播 種 日: 5月23日
移 植 日: 6月20日
処理時期: 移植当日
発生状況: 多発生
調 査 日: 9月1日(移植73日後)
調査方法: 計300株について、上位3葉の
被害率を調査。




■いもち病(葉)

試験場所: 長野県農業試験場(2020年)
品 種: コシヒカリ
播 種 日: 5月8日
移 植 日: 5月27日
処理時期: 移植当日
発生状況: 中発生(接種)
調 査 日: 7月13日(移植47日後)、
7月20日(移植54日後)
調査方法: 計300株(無処理区は90株)に
ついて、発病の有無および病斑
数を調査し、株当りの病斑数か
ら防除値を算出。



■紋枯病

試験場所: 山口県農林総合技術センター
(2020年)
品 種: 日本晴
播 種 日: 5月19日
移 植 日: 6月10日
処理時期: 移植当日
発生状況: 中発生(接種)
調 査 日: 9月16日
(移植98日後、出穂29日後)
調査方法: 計300株について発病株率を
求め、所定基準に従って発病株
の被害度を調査した。そこから
計算される全体の被害度から防
除値を算出。



注意事項

〈薬効・薬害等の注意〉

- 育苗箱の上から均一に散布し、薬に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当りに乾粒として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはいないに行い、移植後田面が露出しないように注意してください。
- 側条施用する場合は、粒剤が均一に散布できる施用装置を装着した田植機を使用してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しないでください。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように処理してください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさけてください。

- 低温での育苗条件では生育抑制を生じるおそれがあるので、温度管理に注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

〈安全使用上の注意〉

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、本剤を使用した苗は養魚田に移植しないでください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

04R2B22S145:HP

2022年2月作成

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学

動画
チャンネルは
こちら！

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 ☎ 0570-058-669
農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>
住友化学アグロ事業部

