


浸透移行性殺虫剤

農林水産省登録
第20959号

殺虫剤分類 4A

三井東圧



アルバリン®

粒剤

アルバリンはアグロカネショウ(株)の登録商標です。



農林水産省「福発酵粗飼料
生産・給与技術マニュアル」
に掲載された農薬です。



アカヒゲホソミドリカスミカメ



キスジノミハムシ



タバココナジラミ



マメハモグリバエ



ワタアブラムシ

特長

- 重要害虫コナジラミ類・ハモグリバエ類をはじめとする多くの害虫に効果があります!
- 水稲カメムシ防除での本田湛水散布、野菜での育苗期処理・生育期株元散布など、幅広い処理方法で害虫防除に貢献します!

■適用害虫及び使用方法 [稲・だいず・きゅうり・うり類(漬物用)・にがうり・メロン・すいか] (2021年12月22日付拡大登録内容を含む)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数
稲	ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、イネドロオイムシ、カメムシ類、イネミスソウムシ	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
だいず えだまめ	フタスジヒメハムシ	6kg/10a	は種時		播溝土壌混和	
きゅうり	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	右表*1)参照。
			定植時		植穴土壌混和	
	コナジラミ類、アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、 収穫開始14日前まで		株元散布	
			定植時		植穴土壌混和	
コナジラミ類 アブラムシ類	1~2g/株 1g/株	育苗期	株元散布			
		定植時	植穴土壌混和			
うり類(漬物用)	アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	
			アブラムシ類、コナジラミ類	1~2g/株		
にがうり	コナジラミ類	2g/株	定植時			
			育苗期			
メロン	コナジラミ類	1~2g/株	育苗期		株元散布	
			定植時		植穴土壌混和	
	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期		株元散布	
			定植時		植穴土壌混和	
アブラムシ類 アザミウマ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和		
		育苗期		株元散布		
すいか	ワタアブラムシ	2g/株	育苗期		株元散布	
			定植時		植穴土壌混和	
			生育期 但し、収穫21日前まで		株元散布	

【作物名の統合】

- 「なばな類」は「非結球あぶらな科葉菜類」に包含されました。

*1)ジノテフランを含む農業の総使用回数

稲	4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)
だいず えだまめ	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内)
きゅうり すいか	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)
うり類(漬物用) にがうり	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
メロン	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
なす	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	
	アザミウマ類	1~2g/株	定植時		植穴土壌混和	
	コナジラミ類		育苗期		株元散布	
	アブラムシ類	1g/株	定植時		植穴土壌混和	
アブラムシ類、コナジラミ類	生育期 但し、収穫前日まで		株元散布			
トマト ミニトマト	アブラムシ類	1~2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	
	ハモグリバエ類、コナジラミ類		育苗期		株元散布	
	コナジラミ類		は種前		培土混和	
ピーマン	アザミウマ類	1~2g/株	定植時	2回以内	植穴土壌混和	
	アブラムシ類		生育期 但し、収穫前日まで		株元散布	
とうがらし類	アブラムシ類	1g/株	育苗期	2回以内	株元散布	
	アブラムシ類		生育期 但し、 収穫開始14日前まで		株元散布	
	アザミウマ類		1~2g/株		定植時	
セルリー かぼちゃ	アブラムシ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和	右表*1)参照。
アブラムシ類、コナジラミ類						
ズッキーニ	アブラムシ類	1g/株	生育期 但し、 収穫開始14日前まで		株元散布	
とうがらし(葉) オクラ	アザミウマ類、アブラムシ類	1g/株	定植時 但し、収穫30日前まで		植穴土壌混和	
アブラムシ類					株元散布	
実えんどう さやえんどう	ハモグリバエ類	9kg/10a	生育期 但し、 収穫開始14日前まで	1回	株元散布	
さやいんげん ブロッコリー	アブラムシ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和	
アブラムシ類、コナガ		2~3g/株	育苗期		株元散布	
キャベツ	アブラムシ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和	
ハイマダラノメイガ		3g/株	定植時		株元散布	
はくさい	アオムシ、コナガ	2~3g/株	定植時		植穴土壌混和	
アブラムシ類		2g/株	定植時		株元散布	
レタス 非結球レタス	ナモグリバエ	培土10当たり15g 1g/株	は種前 育苗期後半		培土混和	
わけぎ	アザミウマ類、ハモグリバエ類	6kg/10a	生育期 但し、収穫21日前まで		株元散布	
ねぎ	ハモグリバエ類	6~9kg/10a	は種時	2回以内	播溝土壌混和	
アザミウマ類	定植時		株元散布			
らっきょう	アザミウマ類		生育期 但し、収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
チンゲンサイ	キスジノミハムシ	6kg/10a	定植時		土壌混和	
ほうれんそう	アブラムシ類		は種時		播溝土壌混和	
だいこん	キスジノミハムシ	4~6kg/10a 9~12kg/10a	は種時		全面土壌混和	右表*1)参照。
	タネバエ	6kg/10a	生育期 但し、収穫30日前まで	1回	散布	
非結球あぶらな科 葉菜類*2)、かぶ	キスジノミハムシ、アブラムシ類		は種時		播溝土壌混和	
にんじん	ハモグリバエ類	9kg/10a	定植時		植穴土壌混和	
しゅんぎく	アブラムシ類	6kg/10a	生育期 但し、収穫21日前まで		全面土壌混和 株元散布	
葉ごぼう	アブラムシ類	6kg/10a	定植時		植穴土壌混和	1回
いちご	ワタアブラムシ	0.5~1g/株	定植時		株元散布	5回以内
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	20g/株	育苗期	5回以内	株元散布	5回以内
なし(苗木)	アブラムシ類	20g/株*7)	定植時	1回	株元散布	1回
くわい	アブラムシ類	3kg/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
さとうきび	カンジャコバナナガカメムシ メイチュウ類	6~9kg/10a 9kg/10a	生育期 但し、収穫45日前まで	2回以内	散布	
ふき	アブラムシ類	20kg/10a	定植後~生育期*5) 但し、収穫45日前まで		土壌表面散布	右表*1)参照。
しょうが	クロバネキノコバエ類	9kg/10a	生育期 但し、収穫14日前まで	1回	株元散布	
食用ぎく	アブラムシ類	1g/株*4)	定植時		植穴土壌混和	
しそ	マメハモグリバエ	2g/株*4)	定植時		植穴土壌混和	
茶	マテイラコナカイガラムシ	2g/株*6)	摘採7日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内
さく ガーベラ	クワシロカイガラムシ	12kg/10a	摘採7日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内
花き類・観葉植物*3)	アブラムシ類	20kg/10a	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内 (土壌混和は 1回以内)
	コナジラミ類	1g/株*4)	生育期	5回以内	株元散布	
つつじ類	ツツジゲンバイ	6kg/10a	定植時	1回	植穴土壌混和	
いぐさ	イグサシムシガ	3~6kg/10a	発生初期	5回以内 2回以内	株元散布 散布	5回以内 2回以内



有効成分:ジノテフラン 1.0%
人畜毒性:普通物*
※「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

*1)ジノテフランを含む農薬の総使用回数

とうがらし類	なす ピーマン	トマト ミニトマト	かぼちゃ	セルリー とうがらし(葉) 食用ぎく しそ	ズッキーニ	わけぎ	オクラ さやえんどう 実えんどう さやいんげん しょうが	キャベツ	はくさい	ブロッコリー	レタス 非結球レタス	ねぎ	葉ごぼう	チンゲンサイ しゅんぎく	かぶ ほうれんそう 非結球あぶらな科 葉菜類*2)	だいこん	にんじん	さとうきび	ふき
4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内)	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	4回以内(は種時の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内)	2回以内(は種時の全面土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内)	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶性の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内)	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	5回以内(粒剤は2回以内、液剤、水溶性及び水和剤は合計3回以内)	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)

*2)チンゲンサイを除く *3)さく、ガーベラを除く *4)但し、10a当たり30kgまで *5)草丈20cm頃まで *6)但し、10a当たり25kgまで *7)但し、10a当たり110kgまで

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。○使用後の空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。○防除日誌を記載しましょう。

本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。本印刷物は2021年12月22日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。 ABG1G01R